



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA
U BANJOJ LUCI

PRIPREMA PACIJENTA ZA ODREĐIVANJE STOLICE NA OKULTNO KRVARENJE

Svrha testa je otkrivanje mikro tragova krvi u stolici koji nisu vidljivi golim okom.

- Sedam dana prije testa i u toku izvođenja testa ne preporučuje se uzimati lijekove koji mogu dovesti do krvarenja u gastrointestinalnom traktu i pojave krvi u stolici (aspirin, indometacin, fenilbutazon, rezerpin, kortikosteroidi).

- Pacijent treba biti na posebnoj dijeti tri dana prije i tokom ispitivanja. Poželjno je uzimati: dobro kuhano meso, piletinu, ćuretinu, ribu, jogurt i mlijeko, kuhano voće i povrće, salate, vlaknastu hranu, kikiriki, kokice.

Treba izbjegavati: pečeno crveno meso (jagnjetina i junetina), jetrene proizvode (paštete, kobasice), bilo koje sirovo voće i povrće, vitamin C.

- Test treba odgoditi u slučaju menstruacije, proljeva, krvarenja iz hemoroida i urinarnog trakta.
- Predviđeno je da se test radi na tri uzorka stolice, po jedan iz svake stolice tokom tri uzastopna dana! Uzorak stolice treba uzeti sa više različitih mjesta, kako bi bio reprezentativan. Posuda za prikupljanje može se kupiti u apoteci, a sadrži posebnu lopaticu za lakše sakupljanje uzorka.

Uzorke obilježiti datumom prikupljanja i brojem uzorka (1. dan, 2. dan, 3. dan). Ukoliko stolica izostane u jednom od tri dana prikupljanja, uzorak nastavite prikupljati sljedeći dan, sve dok ne sakupite sva tri uzorka stolice. Za vrijeme prikupljanja uzorke je potrebno čuvati dobro zatvorene u frižideru. Nakon prikupljanja trećeg uzorka, sva tri uzorka dostavite u Odjeljenje hematološke i biohemijske dijagnostike.

**ODJELJENJE HEMATOLOŠKE I BIOHEMIJSKE DIJAGNOSTIKE
JZU DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI**